

TD 9 : ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES, SUITES RÉCURRENTES

LINÉAIRES

Sauf mention explicite du contraire, les fonctions et suites cherchées sont à valeurs réelles.

► Équations différentielles linéaires d'ordre 1

EXERCICE 9.1 Résoudre les équations différentielles suivantes sur les intervalles I indiqués

PD

- | | |
|---|---|
| 1. $y' + y = e^{2x}, I = \mathbf{R}$ | 6. $y' - y = \operatorname{sh}(x), I = \mathbf{R}$ |
| 2. $2ty'(t) - 3y(t) = t^2, I = \mathbf{R}_+^*$ | 7. $(t^2 + 1)^2 y' + 2t(t^2 + 1)y = 2, I = \mathbf{R}$ |
| 3. $(t - 1)y' - 2y = (t - 1)^3, I =] - \infty, 1[$ | 8. $(1 + x^2)y' - y = 1, I = \mathbf{R}$ |
| 4. $\sqrt{1 - t^2}y' - y = 2, I =] - 1, 1[$ | 9. $y' + y \tan x = \sin(2x), I = \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ |
| 5. $xy' - 2y = x^5 \sin(x), I = \mathbf{R}_+^*$ | |

EXERCICE 9.2 Avec des conditions initiales

PD

Déterminer les solutions aux problèmes de Cauchy suivants :

1. $y' + y = \cos(t)e^t, y(0) = -1$
2. $(x + 1)y' + (x^2 + x + 1)y = x, y(1) = e$
3. $y' + 2xy = e^{x-x^2}, y(0) = 0$

EXERCICE 9.3 Non annulation des solutions d'une équation homogène

F

Soit $y'(t) + a(t)y(t) = 0$ une équation différentielle linéaire homogène d'ordre un, où $a : I \rightarrow \mathbf{R}$ est une fonction continue sur un intervalle I , et soit y_0 une solution de l'équation.

Montrer que s'il existe $t_0 \in I$ tel que $y_0(t_0) = 0$, alors y_0 est la fonction nulle.

EXERCICE 9.4 Raccordement de solutions

AD

Résoudre les équations différentielles suivantes sur \mathbf{R} :

1. $xy' - 2y = 2x^4$.
2. $x(x^2 + 1)y' - (x^2 - 1)y = -2x$
3. $x^2y' - y = (x^2 - 1)e^x$

EXERCICE 9.5 Déterminer toutes les fonctions dérivables sur \mathbf{R} telles que pour tout $t \in \mathbf{R}, f'(t) + f(t) = \int_0^1 f(x) dx \quad (E)$.

AD

► Équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants

EXERCICE 9.6 Équations homogènes

F

Résoudre les équations différentielles suivantes :

- | | | |
|---|---|---|
| 1. $y'' - 2y' + y = 0$ | 3. $y'' + 4y' - 6y = 0$ | 5. $y'' + (-1 + i)y' + (i - 2)y = 0$ |
| 2. $y'' + y' + y = 0, \mathbf{K} = \mathbf{C}$ puis $\mathbf{K} = \mathbf{R}$ | 4. $y'' - 4y' + ay = 0, a \in \mathbf{R}$. | 6. $y'' + 2y' + 10y = 0, \mathbf{K} = \mathbf{C}$ ou \mathbf{R} |

EXERCICE 9.7 Une équation à coefficients complexes

F

Résoudre l'équation complexes suivante : $y'' - (1 - i)y' - 2(1 + i)y = 0$.

Déterminer l'unique solution telle que $y(0) = y'(0) = 1$.

EXERCICE 9.8 Équations avec second membre

PD

Résoudre les équations différentielles suivantes :

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. $y'' + 2y' + y = \operatorname{sh}(x)$ | 4. $y'' - y = e^x \cos(2x)$ |
| 2. $y'' + 4y' + 5y = e^{-2x} \sin(x)$ | |
| 3. $y'' - 3y' + 2y = \sin x + \cos x$. | 5. $y'' + y = \sin(x)$ |

EXERCICE 9.9 Second membre avec indications

AD

- (a) Montrer que l'équation $y'' + 2y' = x^2 - x$ possède une solution polynomiale de degré 3.
(b) En déduire toutes les solutions de $y'' + 2y' = x^2 - x + 2 \operatorname{ch}(x)$.
- Résoudre $y'' - 3y' + 2y = xe^x$. On pourra chercher une solution particulière sous la forme $x \mapsto (ax^2 + bx)e^x$, où a et b sont deux réels.

EXERCICE 9.10 Équation différentielle d'Euler

AD

Soient $(a, b) \in \mathbf{R}^2$, et $c : \mathbf{R}_+^* \rightarrow \mathbf{R}$ continue. On cherche à résoudre, sur \mathbf{R}_+^* , l'équation différentielle (linéaire, d'ordre 2, à coefficients non constants)

$$x^2 y'' + axy' + by = c(x) \quad (E).$$

- On procède au «changement de variable $t = \ln(x)$ », c'est-à-dire que pour y deux fois dérivable sur \mathbf{R}_+^* , on définit une fonction z sur \mathbf{R} par $z : t \mapsto y(e^t)$.
 - Calculer z' et z'' . Exprimer y, y' et y'' en fonction de z, z' et z'' .
 - Montrer que y est solution de (E) si et seulement si z est solution d'une équation à coefficients constants que l'on précisera.
- Résoudre l'équation $x^2 y'' + xy' + y = x^2 + x + 1$.

► Divers

EXERCICE 9.11

AD

- Déterminer toutes les fonctions dérivables sur \mathbf{R} telles que $\forall x \in \mathbf{R}, f'(x) = -f(-x)$.
- Déterminer toutes les fonctions dérivables sur \mathbf{R} telles que $\forall x \in \mathbf{R}, f'(x) = f(-x) + xe^{-x}$.

EXERCICE 9.12 Trouver toutes les fonctions continues sur \mathbf{R} telles que :

D

$$\forall x \in \mathbf{R}, f(x) + \int_0^x (x-t)f(t) dt = 1.$$

EXERCICE 9.13 Changement de fonction inconnue

AD

Résoudre l'équation différentielle (non linéaire, du 1^{er} ordre) $y' = e^{x+y}$ en posant $z = e^{-y}$.

► Suites récurrentes linéaires

EXERCICE 9.14 Donner les termes généraux des suites suivantes :

F

- $u_0 = 7, u_{n+1} = 3u_n + 4,$
- $u_0 = 1, u_1 = 0, u_{n+2} + 4u_n = 4u_{n+1}$
- $u_0 = 1, u_1 = -1, 2u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n$
- $u_0 = 1, u_1 = 2, u_{n+2} = u_{n+1} - u_n$

EXERCICE 9.15 Soit $\theta \in]0, \pi[$, et soit (u_n) la suite définie par

PD

$$u_0 = u_1 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbf{N}, u_{n+2} = 2 \cos(\theta)u_{n+1} - u_n$$

Déterminer le terme général de (u_n) .

EXERCICE 9.16 Montrer qu'une suite arithmético-géométrique (v_n) vérifiant $\forall n \in \mathbf{N}, v_{n+1} = av_n + b$ est une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Déterminer les racines de son polynôme caractéristique.

PD

Retrouver alors le terme général de la suite (v_n) définie par $\begin{cases} v_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbf{N}, v_{n+1} = 2v_n - 3 \end{cases}$.

EXERCICE 9.17 (ENS MP)

TD

Déterminer l'ensemble des applications $f : \mathbf{R}_+^* \rightarrow \mathbf{R}_+^*$ telles que

$$\forall x > 0, f(f(x)) = 6x - f(x)$$

CORRECTION DES EXERCICES DU TD 9

SOLUTION DE L'EXERCICE 9.1

Par facilité, nous nommerons à chaque fois (E) l'équation de l'énoncé et (E₀) l'équation homogène associée.

1. L'équation homogène est $y' + y = 0$, dont les solutions sont les $x \mapsto \lambda e^{-x}$, $\lambda \in \mathbf{R}$.
Cherchons une solution particulière de (E) par variation de la constante, sous la forme $y : x \mapsto \lambda(x)e^{-x}$, où λ est une fonction dérivable.
Alors y est solution de (E) si et seulement si

$$\lambda'(x)e^{-x} - \lambda(x)e^{-x} + \lambda(x)e^{-x} = e^{2x} \Leftrightarrow \lambda'(x) = e^{3x}.$$

Donc par exemple $\lambda(x) = \frac{e^{3x}}{3}$ convient, de sorte que $x \mapsto \frac{e^{2x}}{3}$ est solution de (E).

Et donc les solutions de (E) sont les $x \mapsto \frac{e^{2x}}{3} + \lambda e^{-x}$, $\lambda \in \mathbf{R}$.

2. Commençons par mettre l'équation sous forme normalisée : $y'(t) - \frac{3}{2t}y(t) = \frac{t}{2}$.

Les solutions de l'équation homogène $y'(t) - \frac{3}{2t}y(t) = 0$ sont les fonctions de la forme $t \mapsto \lambda e^{\frac{3}{2}\ln(t)} = \lambda t\sqrt{t}$, $\lambda \in \mathbf{R}$.

Cherchons une solution particulière sous la forme $y : t \mapsto \lambda(t)t\sqrt{t}$.

Alors $y'(t) = \lambda'(t)t\sqrt{t} + \lambda(t)\frac{3}{2}\sqrt{t}$.

Et donc y est solution de l'équation si et seulement si pour tout $t \in \mathbf{R}_+^*$,

$$2t^2\sqrt{t}\lambda'(t) + 3\lambda(t)t\sqrt{t} - 3\lambda(t)t\sqrt{t} = t^2 \Leftrightarrow \lambda'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}.$$

On peut donc choisir $\lambda(t) = \sqrt{t}$, et donc une solution de l'équation de départ est $t \mapsto t^2$.
Et donc les solutions de (E) sont exactement les fonctions de la forme $t \mapsto t^2 + \lambda t\sqrt{t}$, $\lambda \in \mathbf{R}$.

3. L'équation sous forme normalisée est $y' - \frac{2}{t-1}y = (t-1)^2$.

Les solutions de l'équation homogène sont les $t \mapsto \lambda e^{2\ln(1-t)} = \lambda(1-t)^2$, $\lambda \in \mathbf{R}$.

Cherchons une solution particulière à l'aide de la méthode de variation de la constante, sous la forme $y : t \mapsto \lambda(t)(t-1)^2$.

Alors y est solution de (E) si et seulement si

$$\lambda'(t)(t-1)^2 + 2\lambda(t)(t-1) - 2\lambda(t)(t-1) = (t-1)^2 \Leftrightarrow \lambda'(t) = 1.$$

Et donc $\lambda(t) = t$ convient, de sorte que les solutions de (E) sont les $t \mapsto (t-1)^2(\lambda+t)$, $\lambda \in \mathbf{R}$.

4. On a (E₀) : $y' - \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}y = 0$.

Or une primitive de $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$ est la fonction Arcsin, de sorte que les solutions de l'équation homogène sont les $t \mapsto \lambda e^{\text{Arcsin}(t)}$, $\lambda \in \mathbf{R}$.

Plutôt que d'appliquer la méthode de variation de la constante, notons que la fonction constante $t \mapsto -2$ est solution.

Et donc les solutions de (E) sont les $t \mapsto -2 + \lambda e^{\text{Arcsin}(t)}$, $\lambda \in \mathbf{R}$.

5. Sous forme normalisée, l'équation s'écrit $y' - \frac{2}{x}y = x^4 \sin(x)$.

L'équation homogène est alors $y' - \frac{2}{x}y = 0$. Or, une primitive de $x \mapsto -\frac{2}{x}$ sur \mathbf{R}_-^* est $x \mapsto -2\ln(-x) = -\ln(x^2)$.

Donc les solutions de l'équation homogène sont les $x \mapsto \lambda e^{\ln(x^2)} = \lambda x^2$, $\lambda \in \mathbf{R}$.

Pour trouver une solution particulière, utilisons la méthode de variation de la constante en la cherchant sous la forme $y : x \mapsto \lambda(x)x^2$.

La fonction y est alors solution de (E) si et seulement si

$$\lambda'(x)x^2 + 2x\lambda(x) - 2x\lambda(x) = x^4 \sin(x) \Leftrightarrow \lambda'(x) = x^2 \sin(x).$$

Astuce

Le but de la méthode de variation de la constante est de trouver une solution particulière. Si on en voit une directement, il ne faut pas se priver de l'utiliser.

Pour déterminer une primitive de $x \mapsto x^2 \sin(x)$ réalisons deux intégrations par parties :

$$\begin{aligned} \int x^2 \sin x \, dx &= [-x^2 \cos x] + 2 \int x \cos(x) \, dx \\ &= -x^2 \cos(x) + 2[x \sin(x)] - 2 \int \sin(x) \, dx \\ &= -x^2 \cos(x) + 2x \sin(x) + 2 \cos(x) + C. \end{aligned}$$

Et donc une solution particulière de (E) est $x \mapsto x^2((2 - x^2) \cos(x) + 2x \sin(x))$.

Et par conséquent, les solutions de (E) sont les

$$x \mapsto x^2((2 - x^2) \cos(x) + 2x \sin(x) + \lambda), \lambda \in \mathbf{R}.$$

6. L'équation homogène est $y' - y = 0$, qui possède pour solutions les $\lambda \mapsto \lambda e^x$, $\lambda \in \mathbf{R}$.
Cherchons une solution particulière sous la forme $y : x \mapsto \lambda(x)e^x$.
Alors y est solution de (E) si et seulement si

$$\lambda'(x)e^x + \lambda(x)e^x - \lambda(x)e^x = \operatorname{sh}(x) \Leftrightarrow \lambda'(x) = \frac{\operatorname{sh}(x)}{x} = \frac{1}{2}(1 - e^{-2x}).$$

Et donc $\lambda(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{e^{-2x}}{2} \right)$ convient.

Par conséquent, une solution de (E) est $x \mapsto \frac{xe^x}{2} + \frac{e^{-x}}{4}$ et donc les solutions de (E) sont les

$$x \mapsto e^x \left(\lambda + \frac{x}{2} \right) + \frac{e^{-x}}{4}, \lambda \in \mathbf{R}.$$

7. L'équation sous forme normalisée s'écrit $y' + \frac{2t}{1+t^2}y = \frac{2}{(1+t^2)^2}$.

L'équation homogène est $y' + \frac{2t}{1+t^2}y = 0$.

Une primitive de $t \mapsto \frac{2t}{1+t^2}$ est $t \mapsto \ln(1+t^2)$, de sorte que les solutions de (E_0) sont les

$$t \mapsto \lambda e^{-\ln(1+t^2)} = \frac{\lambda}{1+t^2}, \lambda \in \mathbf{R}.$$

Cherchons une solution particulière sous la forme $y(t) = \frac{\lambda(t)}{1+t^2}$.

Alors y est solution de (E) si et seulement si

$$\frac{\lambda'(t)}{1+t^2} - \frac{2t\lambda(t)}{(1+t^2)^2} + \frac{2t\lambda(t)}{(1+t^2)^2} = \frac{2}{(1+t^2)^2} \Leftrightarrow \lambda'(t) = -\frac{2}{1+t^2}.$$

Et donc $\lambda(t) = 2 \operatorname{Arctan}(t)$ convient, de sorte qu'une solution particulière de (E) est

$$y : t \mapsto \frac{2 \operatorname{Arctan}(t)}{1+t^2}.$$

Et donc les solutions de (E) sont les

$$t \mapsto \frac{2 \operatorname{Arctan}(t) + \lambda}{1+t^2}, \lambda \in \mathbf{R}.$$

8. La forme normalisée de l'équation est $y' - \frac{1}{1+t^2}y = \frac{1}{1+t^2}$.

Les solutions de (E_0) sont les $t \mapsto \lambda e^{\operatorname{Arctan}(t)}$, $\lambda \in \mathbf{R}$.

Cherchons une solution sous la forme $y(t) = \lambda(t)e^{\operatorname{Arctan}(t)}$. Alors y est solution de (E) si et seulement si pour tout $t \in \mathbf{R}$,

$$\lambda'(t)e^{\operatorname{Arctan}(t)} + \lambda(t)\frac{1}{1+t^2}e^{\operatorname{Arctan}(t)} - \lambda(t)\frac{1}{1+t^2}e^{\operatorname{Arctan}(t)} = \frac{1}{1+t^2} \Leftrightarrow \lambda'(t) = \frac{1}{1+t^2}e^{-\operatorname{Arctan}(t)}.$$

Or, une primitive de $\frac{1}{1+t^2}e^{-\operatorname{Arctan}(t)}$ est $t \mapsto -e^{-\operatorname{Arctan}(t)}$, et donc une solution particulière de (E) est $t \mapsto -e^{-\operatorname{Arctan}(t)}e^{\operatorname{Arctan}(t)} = -1$.

On en déduit que les solutions de (E) sont les

$$t \mapsto \lambda e^{\operatorname{Arctan}(t)} - 1, \lambda \in \mathbf{R}.$$

Remarque

Si on remarquait dès le départ que la fonction constante égale à -1 était solution, alors il ne fallait pas se priver de l'utiliser !

9. Rappelons qu'une primitive de $t \mapsto \tan(t)$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ est $t \mapsto -\ln(\cos t)$.

Et donc les solutions de l'équation homogène sont les $t \mapsto \lambda e^{\ln(\cos t)} = \lambda \cos t$, $\lambda \in \mathbf{R}$.
Cherchons une solution particulière sous la forme $y : t \mapsto \lambda(t) \cos t$.
Alors y est solution de (E) si et seulement si

$$\lambda'(t) \cos(t) - \lambda(t) \sin(t) + \tan(t) \lambda(t) \cos(t) = \sin(2t) \Leftrightarrow \lambda'(t) = \frac{\sin(2t)}{\cos(t)}.$$

Mais $\sin(2t) = 2 \sin(t) \cos(t)$, de sorte que $\lambda'(t) = 2 \sin(t)$. Donc $\lambda(t) = -2 \cos(t)$ convient, et donc les solutions de (E) sont les $t \mapsto \lambda \cos t - 2 \cos^2 t$, $\lambda \in \mathbf{R}$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 9.2

1. Les solutions de l'équation homogène sont les $t \mapsto \lambda e^{-t}$, $\lambda \in \mathbf{R}$.
Cherchons une solution particulière sous la forme $y : t \mapsto \lambda(t) e^{-t}$.
Alors y est solution de (E) si et seulement si pour tout $t \in \mathbf{R}$,

$$\lambda'(t) e^{-t} - e^{-t} \lambda(t) + e^{-t} \lambda(t) = \cos(t) e^t \Leftrightarrow \lambda'(t) = \cos(t) e^{2t}.$$

Utilisons les nombres complexes pour trouver une primitive de $t \mapsto \cos(t) e^{2t} = \operatorname{Re}(e^{(2+i)t})$.
Une primitive de $t \mapsto e^{(2+i)t}$ est

$$t \mapsto \frac{1}{2+i} e^{(2+i)t} = \frac{2-i}{5} e^{2t} (\cos(t) + i \sin(t)).$$

Donc une primitive de sa partie réelle est $t \mapsto \frac{e^{2t}}{5} (2 \cos(t) + \sin(t))$.

Et donc les solutions de (E) sont les

$$y : t \mapsto \lambda e^{-t} + \frac{e^t}{5} (2 \cos(t) + \sin(t)), \lambda \in \mathbf{R}.$$

En particulier, on a $y(0) = \lambda + \frac{2}{5}$ et donc $y(0) = -1 \Leftrightarrow \lambda = -\frac{7}{5}$.

Donc l'unique solution au problème de Cauchy posé est $t \mapsto \frac{1}{5} (-7e^{-t} + e^t (2 \cos(t) + \sin(t)))$.

2. Résolvons l'équation normalisée $y' + \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} y = \frac{x}{x + 1}$ sur $] -1, +\infty[$.

L'équation homogène est $y' + \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} y = 0$.

Mais une division euclidienne nous donne $\frac{x^2 + x + 1}{x + 1} = x + \frac{1}{x + 1}$.

Une primitive de $x \mapsto x + \frac{1}{x + 1}$ est alors $x \mapsto \frac{x^2}{2} + \ln(x + 1)$.

Et donc les solutions de l'équation homogène sont les

$$x \mapsto \frac{\lambda}{x + 1} e^{-x^2/2}, \lambda \in \mathbf{R}.$$

Cherchons une solution particulière par variation de la constante, sous la forme $y(x) = \frac{\lambda(x)}{x + 1} e^{-x^2/2}$

où λ est une fonction dérivable.

On a alors $y'(x) = \lambda'(x) \frac{e^{-x^2/2}}{x+1} + \lambda(x) e^{-x^2/2} \frac{-x(x+1)-1}{(x+1)^2}$.

Et donc $y'(x) + \frac{x^2 + x + 1}{(x + 1)^2} y(x) = \frac{x}{x + 1}$ si et seulement si

$$\lambda'(x) \frac{e^{-x^2/2}}{x + 1} = \frac{x}{x + 1} \Leftrightarrow \lambda'(x) = x e^{x^2/2}.$$

Une solution est alors $\lambda(x) = e^{x^2/2}$, de sorte qu'une solution particulière de l'équation complète¹ est $x \mapsto \frac{1}{x+1}$.

Donc les solutions de l'équation complète sont les

$$x \mapsto \frac{\lambda e^{-x^2/2} + 1}{x + 1}, \lambda \in \mathbf{R}.$$

Signe

Notons qu'il n'y a pas besoin de valeur absolue dans le logarithme car sur I , le cosinus est positif.

Intervalle

Notons qu'on n'a pas vraiment le choix dans l'intervalle de résolution, puisque nous voulons que 1 en soit un élément au vu de la condition initiale.

¹ Avec second membre.

En particulier, on a $y(1) = e \Leftrightarrow 2e = \lambda e^{-1/2} + 1 \Leftrightarrow \lambda = (2e - 1)e^{1/2}$.
Et donc l'unique solution de l'équation satisfaisant à la condition initiale est

$$x \mapsto \frac{1 + (2e - 1)e^{(1-x^2)/2}}{x + 1}.$$

3. L'équation homogène est $y' + 2xy = 0$, qui est facile à résoudre : ses solutions sont les $x \mapsto \lambda e^{-x^2}$, $\lambda \in \mathbf{R}$.
Cherchons une solution particulière par variation de la constante, sous la forme $y(x) = \lambda(x)e^{-x^2}$.
Alors y est solution si et seulement si $\lambda'(x)e^{-x^2} = e^{x-x^2} \Leftrightarrow \lambda'(x) = e^x$.
Donc $\lambda(x) = e^x$ convient.
On en déduit que $x \mapsto e^{x-x^2}$ est une solution particulière, et donc que les solutions de l'équation sont les

$$x \mapsto \lambda e^{-x^2} + e^{x-x^2}, \lambda \in \mathbf{R}.$$

Et donc l'unique solution telle que $y(0) = 0$ correspond à $\lambda = -1$, c'est donc $x \mapsto e^{-x^2}(e^x - 1)$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 9.3

Une solution simple consiste à remarquer qu'il y a unicité de la solution vérifiant $y(t_0) = 0$, et que la fonction nulle satisfait cette condition.

Donc si $y_0(t_0) = 0$, nécessairement y_0 est la fonction nulle.

Plus simplement, nous savons que les solutions de l'équation sont les $t \mapsto \lambda e^{-A(t)}$ où A est une primitive de a .

Donc il existe $\lambda_0 \in \mathbf{R}$ tel que $\forall t \in I$, $y_0(t) = \lambda_0 e^{-A(t)}$.

Et une exponentielle n'étant jamais nulle, il vient $y_0(t_0) = 0 \Leftrightarrow \lambda_0 = 0$, de sorte que y_0 est la fonction nulle.

SOLUTION DE L'EXERCICE 9.4

1. Sur \mathbf{R}_+^* et sur \mathbf{R}_-^* , les solutions de l'équation homogène sont les $x \mapsto \lambda x^2$, $\lambda \in \mathbf{R}$.
Et une solution particulière est $x \mapsto x^4$.
Donc sur chacun des deux intervalles \mathbf{R}_+^* et \mathbf{R}_-^* , l'ensemble des solutions est $\{x \mapsto \lambda x^2 + x^4, \lambda \in \mathbf{R}\}$.

Une solution de l'équation sur \mathbf{R} tout entier vérifie donc toujours $y(x) = \begin{cases} \lambda_1 x^2 + x^4 & \text{si } x > 0 \\ \lambda_2 x^2 + x^4 & \text{si } x < 0 \end{cases}$,

avec (λ_1, λ_2) deux réels.

Mais une fonction de cette forme-ci est toujours continue, si on pose $y(0) = 0$.

Et mieux, elle est toujours dérivable en 0 car $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lambda x^2 + x^4}{x} = 0$.

Et donc, pour tout $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbf{R}^2$, $x \mapsto \begin{cases} \lambda_1 x^2 + x^4 & \text{si } x \geq 0 \\ \lambda_2 x^2 + x^4 & \text{si } x < 0 \end{cases}$ est solution de l'équation sur

\mathbf{R} .




FIGURE 9.1 – Toute solution sur \mathbf{R}_+^* se raccorde en 0 à toute solution sur \mathbf{R}_-^* .

2. Sur \mathbf{R}_+^* et \mathbf{R}_-^* , on peut se ramener à l'équation différentielle linéaire sous forme normalisée $y' - \frac{x^2 - 1}{x(x^2 + 1)}y = -\frac{2}{x^2 + 1}$.

Une décomposition en éléments simples nous donne $\frac{X^2 - 1}{X(X^2 + 1)} = -\frac{1}{X} + \frac{2X}{X^2 + 1}$.

Et donc les solutions (sur \mathbf{R}_+^* comme sur \mathbf{R}_-^*) de l'équation homogène sont les $x \mapsto \lambda \frac{x^2 + 1}{x}$.

En procédant à la variation de la constante, en cherchant une solution particulière sous la forme $x \mapsto \lambda(x) \frac{x^2 + 1}{x}$, on arrive à $\lambda'(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}$, qui s'intègre en $\lambda(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

Et donc une solution particulière est $x \mapsto \frac{1}{x}$.

Ainsi, sur chacun des intervalles \mathbf{R}_+^* et \mathbf{R}_-^* , l'ensemble des solutions est $\left\{ x \mapsto \lambda \left(x + \frac{1}{x} \right) + \frac{1}{x}, \lambda \in \mathbf{R} \right\}$.

Une solution de l'équation sur \mathbf{R} tout entier est alors nécessairement de la forme

$$x \mapsto \begin{cases} \lambda_1 \left(x + \frac{1}{x} \right) + \frac{1}{x} & \text{si } x < 0 \\ \lambda_2 \left(x + \frac{1}{x} \right) + \frac{1}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \text{avec } (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbf{R}^2$$

Mais une telle fonction admet une limite finie en 0^- si et seulement si $\lambda_1 = -1$, et de même, elle admet une limite finie en 0^+ si et seulement si $\lambda_2 = -1$.

Donc la seule solution possible sur \mathbf{R} est $x \mapsto -x$, dont on vérifie aisément qu'elle est dérivable, et satisfait l'équation.




FIGURE 9.2 – Une seule option pour le raccord.

3. Sur \mathbf{R}_+^* et sur \mathbf{R}_-^* , les solutions de l'équation homogène sont les $x \mapsto \lambda e^{-1/x}$.

Et la variation de la constante nous amène à chercher une primitive de $x \mapsto \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) e^{x+\frac{1}{x}}$.

Une telle primitive est $x \mapsto e^{x+\frac{1}{x}}$, et donc une solution particulière² est $x \mapsto e^x$.

Ainsi, sur \mathbf{R}_+^* , les solutions de l'équation sont³ les

$$x \mapsto \lambda e^{-1/x} + e^x, \lambda \in \mathbf{R}$$

et de même les solutions sur \mathbf{R}_-^* sont les

$$x \mapsto \mu e^{-1/x} + e^x, \mu \in \mathbf{R}.$$

Donc une solution éventuelle y sur \mathbf{R} vérifie

$$y(x) = \begin{cases} \lambda e^{-1/x} + e^x & \text{si } x < 0 \\ \mu e^{-1/x} + e^x & \text{si } x > 0 \end{cases}, (\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2$$

Or, $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{-1/x} = +\infty$, et donc y admet une limite finie en 0^- si et seulement si $\lambda = 0$, et cette limite vaut alors 1.

En revanche, pour tout $\mu \in \mathbf{R}$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \mu e^{-1/x} + e^x = 1$.

Donc toute fonction de la forme $y \mapsto y(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x \leq 0 \\ \mu e^{-1/x} + e^x & \text{si } x > 0 \end{cases}$ est continue en 0.

Il reste à s'assurer de la dérivabilité.

Mais $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = e^0 = 1$, et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-1/x}}{x} = \lim_{X \rightarrow +\infty} X e^{-X} = 0$.

Donc une telle fonction est toujours dérivable en 0, et donc les solutions de l'équation

différentielle sur \mathbf{R} tout entier sont les $x \mapsto \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ \mu e^{-1/x} + e^x & \text{si } x > 0 \end{cases}, \lambda \in \mathbf{R}.$

² Sur \mathbf{R}_+^* , mais aussi sur \mathbf{R}_-^* .

³ Somme de la solution particulière et des solutions de l'équation homogène.

Rappel

La limite de $\frac{e^x - 1}{x}$ est la dérivée de e^x en 0.




FIGURE 9.3 – Seule $x \mapsto e^x$ sur \mathbf{R}^* se raccorde à une (et en fait à toutes) les solutions sur \mathbf{R}_+ .

SOLUTION DE L'EXERCICE 9.5

Supposons que f soit une solution. Alors $\int_0^1 f(x) dx$ est une constante, notons la A .

Donc f satisfait l'équation différentielle $y' + y = A$, dont les solutions sont de la forme $t \mapsto \lambda e^{-t} + A$, $\lambda \in \mathbf{R}$.

Par conséquent, il existe $\lambda \in \mathbf{R}$ tel que pour tout $t \in \mathbf{R}$, $f(t) = \lambda e^{-t} + A$.

D'autre part, on a alors

$$A = \int_0^1 f(x) dx = \lambda \int_0^1 e^{-x} dx + A.$$

Et donc nécessairement, $\lambda = 0$, de sorte que f est constante, égale à A .

Inversement, pour tout $A \in \mathbf{R}$, on a $\int_0^1 A dx = A$, et donc la fonction constante égale à A est solution de (E).

Donc les solutions de (E) sont les fonctions constantes.

SOLUTION DE L'EXERCICE 9.6

1. Puisque 1 est racine double du polynôme caractéristique, les solutions sont les

$$y : t \mapsto (\lambda t + \mu)e^t, (\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2.$$

2. Le polynôme caractéristique est $r^2 + r + 1$ qui possède j et \bar{j} comme racines.

Donc les solutions complexes sont les $t \mapsto \lambda e^{jt} + \mu e^{\bar{j}t}$, $(\lambda, \mu) \in \mathbf{C}^2$.

Pour obtenir les solutions réelles, il faut se souvenir que $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Et donc les solutions réelles sont les

$$t \mapsto e^{-t/2} \left(\lambda \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \mu \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right), (\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2.$$

3. Les racines (réelles) du polynôme caractéristique sont $-2 - \sqrt{10}$ et $-2 + \sqrt{10}$, donc les solutions sont les

$$t \mapsto \lambda e^{(-\sqrt{10}-2)t} + \mu e^{(\sqrt{10}-2)t}, (\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2.$$

4. Le discriminant du polynôme caractéristique est $\Delta = 4(4 - a)$, dont le signe est celui de $4 - a$.

Si $a \leq 4$, alors il y a deux racines réelles qui sont $2 + \pm\sqrt{4 - a}$ et donc les solutions sont les

$$t \mapsto \lambda e^{(2+\sqrt{4-a})t} + \mu e^{(2-\sqrt{4-a})t}, (\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2.$$

En revanche, si $a > 4$, alors le polynôme caractéristique possède deux racines complexes conjuguées qui sont $2 + \pm i\sqrt{a - 4}$, et donc les solutions de l'équation différentielle sont les

$$t \mapsto e^{2t} \left(\lambda \cos(\sqrt{a - 4}t) + \mu \sin(\sqrt{a - 4}t) \right), (\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2.$$

5. Les racines complexes du polynôme caractéristique sont i et $-1 + i$, de sorte que les solutions sont les

$$y : t \mapsto \lambda e^{it} + \mu e^{(-1+i)t}, (\lambda, \mu) \in \mathbf{C}^2.$$

Astuce

Ces racines se retrouvent sans calcul si vous vous souvenez que la somme des racines cubiques de l'unité est nulle.

6. Le discriminant du polynôme caractéristique vaut -36 , donc ses racines sont $-1 \pm 3i$.
On en déduit que les solutions complexes de l'équation sont les

$$y : t \mapsto \lambda e^{(-1+3i)t} + \mu e^{(-1-3i)t}, (\lambda, \mu) \in \mathbf{C}^2.$$

Et les solutions réelles sont les

$$t \mapsto e^{-t} (\lambda \cos(3t) + \mu \sin(3t)), (\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2.$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 9.7

Le polynôme caractéristique est $r^2 - (1-i)r - 2(1+i)$. Son discriminant est $\Delta = (1-i)^2 + 8(1+i) = 8 - 6i$.

Une racine carrée en est $\delta = 3 + i$, donc les racines en sont 2 et $-1 - i$.

Donc les solutions de l'équation sont les

$$y : t \mapsto \lambda e^{2t} + \mu e^{-(1+i)t}, (\lambda, \mu) \in \mathbf{C}^2.$$

En particulier, on a $y(0) = y'(0) = 1$ si et seulement si

$$\begin{cases} \lambda + \mu = 1 \\ 2\lambda - (1+i)\mu = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{7+i}{10} \\ \mu = \frac{3-i}{10} \end{cases}$$

Donc la solution cherchée est

$$t \mapsto \frac{7+i}{10} e^{2t} + \frac{3-i}{10} e^{-(1+i)t}.$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 9.8

1. Le polynôme caractéristique est $r^2 + 2r + 1 = (r+1)^2$, qui possède -1 comme racine double.
Donc les solutions de l'équation homogène sont les $x \mapsto (\lambda x + \mu)e^{-x}$, $(\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2$.

Puisque $\text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, cherchons des solutions particulières aux équations

$$(E_1) : y'' + 2y' + y = \frac{e^x}{2} \text{ et } (E_2) : y'' + 2y' + y = -\frac{e^{-x}}{2},$$

puis appliquons le principe de superposition.

Puisque 1 n'est pas racine du polynôme caractéristique, il existe une solution de (E_1) sous la forme $y(x) = \lambda e^x$.

$$\text{On a alors } y'' + 2y' + y = \frac{e^x}{2} \Leftrightarrow 4\lambda e^x = \frac{e^x}{2} \Leftrightarrow \lambda = \frac{1}{8}.$$

Donc une solution de (E_1) est $x \mapsto \frac{e^x}{8}$.

D'autre part, -1 étant racine double du polynôme caractéristique, il existe une solution de (E_2) sous la forme $y : x \mapsto \lambda x^2 e^{-x}$.

y est alors solution de (E_2) si et seulement si pour tout $x \in \mathbf{R}$,

$$\lambda(x^2 - 4x + 2)e^{-x} + 2\lambda(-x^2 + 2x)e^{-x} + \lambda x^2 e^{-x} = -\frac{e^{-x}}{2} \Leftrightarrow 2\lambda = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \lambda = -\frac{1}{4}.$$

Et donc une solution de (E_2) est $x \mapsto -\frac{x^2 e^{-x}}{4}$.

Par le principe de superposition, une solution de (E) est $x \mapsto \frac{e^x}{8} - \frac{x^2 e^{-x}}{4}$, et donc les solutions de (E) sont les

$$x \mapsto \left((\lambda x + \mu) - \frac{x^2}{4} \right) e^{-x} + \frac{e^x}{8}, (\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2.$$

2. Les racines⁴ de l'équation caractéristique sont $-2 \pm i$, donc l'ensemble des solutions réelles de l'équation homogène est

$$\left\{ x \mapsto \lambda e^{-2x} \cos(x) + \mu e^{-2x} \sin(x), (\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2 \right\}$$

⁴ Conjuguées bien entendu.

Mais les solutions complexes sont également connues, ce sont les $x \mapsto \lambda e^{(-2+i)x} + \mu e^{(-2-i)x}$, où $(\lambda, \mu) \in \mathbf{C}^2$.

Puisque $e^{-2x} \sin(x) = \text{Im}(e^{(-2+i)x})$, cherchons une solution particulière de $y'' + 4y' + 5y = e^{(-2+i)x}$, il suffira ensuite d'en considérer la partie imaginaire.

Puisque $-2 + i$ est racine simple du polynôme caractéristique, il existe une solution sous la forme $y : x \mapsto axe^{(-2+i)x}$.

On a alors $y'(x) = ae^{(-2+i)x} + a(-2+i)xe^{(-2+i)x} = ae^{(-2+i)x}(1 + (-2+i)x)$.

Et de même, $y''(x) = ae^{(-2+i)x}(-2+i-2+i(-2+i)x) = a(-4+2i+(3-4i)x)e^{(-2+i)x}$.

Ainsi, il vient

$$y''(x) + 4y'(x) + 5y(x) = a2ie^{(-2+i)x}.$$

Et donc ceci est égal à $e^{(-2+i)x}$ si et seulement $2ai = 1 \Leftrightarrow a = \frac{1}{2i} = \frac{-i}{2}$.

Et dans ce cas, la partie imaginaire de $-\frac{i}{2}xe^{(-2+i)x}$ est $-\frac{e^{-2x}x \cos x}{2}$, qui est donc une solution particulière de l'équation.

Enfin, les solutions de l'équation sont les

$$x \mapsto e^{-2x} \left(\cos(x) \frac{\lambda - x}{2} \right) + \mu \sin(x)$$

où λ et μ sont deux réels.

Alternative : une autre méthode est de remarquer que $e^{-2x} \sin(x) = \frac{1}{2i}(e^{(-2+i)x} - e^{(-2-i)x})$, de chercher des solutions (complexes) aux deux équations

$$y'' + 4y' + 5y = \frac{1}{2i}e^{(-2+i)x} \text{ et } y'' + 4y' + 5y = \frac{1}{2i}e^{(-2-i)x}$$

puis d'appliquer le principe de superposition.

3. Les solutions de l'équation homogène sont les $x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{2x}$, $(\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2$.

Pour trouver une solution particulière, utilisons les complexes, en notant que

$$\cos x + \sin x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} + \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} = \frac{1}{2}(e^{ix}(1-i) + e^{-ix}(1+i)).$$

Par le principe de superposition, il suffit de trouver des solutions à $y'' - 3y' + 2y = \frac{e^{ix}}{2}(1-i)$

et $y'' - 3y' + 2y = \frac{e^{-ix}}{2}(1+i)$.

Traisons en détails la première, la seconde étant du même tonneau : i n'est pas racine du polynôme caractéristique, donc il existe une solution sous la forme $x \mapsto ae^{ix}$, $a \in \mathbf{C}$.

On a alors $y'(x) = iae^{ix}$ et $y''(x) = -ae^{ix}$, de sorte que

$$y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = ae^{ix}(-1 - 3i + 2).$$

Et donc y est solution de $y'' - 3y' + 2y = \frac{e^{ix}}{2}(1-i)$ si et seulement si

$$a(1-3i) = \frac{1-i}{2} \Leftrightarrow a = \frac{1}{5} + \frac{i}{10}.$$

De même, on prouve que $x \mapsto \left(\frac{1}{5} - \frac{i}{10}\right)e^{-ix}$ est solution de $y'' - 3y' + 2y = \frac{e^{-ix}}{2}(1+i)$.

Et donc par le principe de superposition, une solution de l'équation de départ est

$$x \mapsto \frac{1}{10}(e^{ix}(2+i) + e^{-ix}(2-i)) = \frac{2}{5} \cos(x) - \frac{\sin x}{5}.$$

Et donc enfin, les solutions de l'équation sont les

$$x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{2x} + \frac{2 \cos x}{5} - \frac{\sin x}{5}, (\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2.$$

Remarque

Notons que cette solution est bien à valeurs réelles.

4. Passer par les complexes, en notant que $e^x \cos(2x) = \frac{1}{2} (e^{(1+2i)x} + e^{(1-2i)x})$ et que ni $1 + 2i$, ni $1 - 2i$ ne sont racines du polynôme caractéristique.
On trouve alors pour solutions les

$$x \mapsto \lambda e^{-x} + \mu e^x - \frac{e^x}{8} (\cos(2x) + \sin(2x)).$$

5. Cette fois, i et $-i$ sont racines. On trouve

$$x \mapsto \lambda \cos(x) + \mu \sin(x) - \frac{x}{2} \cos(x).$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 9.9

- 1.a. Cherchons donc une solution sous la forme $y : x \mapsto ax^3 + bx^2 + cx + d$.
On a alors $y' : x \mapsto 3ax^2 + 2bx + c$ et $y'' : x \mapsto 6ax + 2b$.
Et donc y est solution de l'équation si et seulement si pour tout $x \in \mathbf{R}$,

$$y''(x) + 2y'(x) = x^2 - x \Leftrightarrow 6ax^2 + (6a + 2b)x + c + 2b = x^2 - x.$$

Par identification des coefficients, c'est le cas si et seulement si

$$\begin{cases} 6a = 1 \\ 6a + 2b = -1 \\ c + 2b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{6} \\ b = -\frac{1}{2} \\ c = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Donc $y_1 : x \mapsto \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x}{2}$ convient.

- 1.b. Par le principe de superposition, il suffit de trouver une solution de $y'' + 2y' = 2 \operatorname{ch}(x)$, et de l'ajouter à y_1 pour obtenir une solution de l'équation.
Mais, puisque $2 \operatorname{ch}(x) = e^x + e^{-x}$, il suffit, toujours par le principe de superposition, de trouver des solutions de $y'' + 2y' = e^x$ et $y'' + 2y' = e^{-x}$.

De telles solutions sont $x \mapsto \frac{e^x}{3}$ et $x \mapsto -e^{-x}$.

On en déduit qu'une solution particulière de l'équation complète est

$$x \mapsto \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} + \frac{e^x}{3} - e^{-x}.$$

Enfin, les racines du polynôme caractéristique sont 0 et -2 , donc les solutions de l'équation homogène sont les $x \mapsto \lambda e^{-2x} + \mu$, $(\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2$.

Et donc l'ensemble des solutions est

$$\left\{ x \mapsto \lambda e^{-2x} + \mu + \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} + \frac{e^x}{3} - e^{-x}, (\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2 \right\}.$$

2. Sur le même principe, on trouve comme solution particulière $x \mapsto -e^x \left(\frac{x^2}{2} + x \right)$ et donc l'ensemble des solutions de l'équation est

$$\left\{ - \left(\frac{x^2}{2} + x + \lambda \right) e^x + \mu e^{2x}, (\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2 \right\}.$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 9.10

- 1.a. Par dérivation d'une composée, on a $z'(t) = e^t y'(e^t)$ et donc $y'(e^t) = e^{-t} z'(t)$.
Et de même, $z''(t) = e^{2t} y''(e^t) + e^t y'(e^t)$, de sorte que $y''(e^t) = e^{-2t} (z''(t) - z'(t))$.
- 1.b. La fonction y est solution de (E) si et seulement si pour tout $t \in \mathbf{R}$,

$$e^{2t} y''(e^t) + a e^t y'(e^t) + b y(e^t) = c(e^t) \Leftrightarrow z''(t) - z'(t) + a z'(t) + b z(t) = c(e^t).$$

Nous sommes alors bien en présence d'une équation à coefficients constants.

Et d ?

Puisque d n'intervient pas dans ce système, on peut le choisir comme bon nous semble.

2. Avec le changement de variable précédent, il s'agit donc de résoudre

$$z''(t) + z(t) = e^{2t} + e^t + 1.$$

Les solutions de l'équation homogène sont les $t \mapsto \lambda \cos t + \mu \sin t$, $(\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2$.

La recherche d'une solution particulière peut se faire à l'aide du principe de superposition, en notant que 2, 1 et 0 ne sont pas racines du polynôme caractéristique.

Après calcul, une solution particulière est $t \mapsto \frac{1}{5}e^{2t} + \frac{1}{2}e^t + 1$.

Ne reste alors plus qu'à revenir à la fonction de départ : pour $x > 0$, on a $y(x) = z(\ln(x))$, et donc les solutions de l'équation sont les

$$x \mapsto \lambda \cos(\ln x) + \mu \sin(\ln x) + \frac{x^2}{5} + \frac{x}{2} + 1, (\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2.$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 9.11

1. Soit f une fonction satisfaisant à la condition de l'énoncé. Alors f' est dérivable puisque f l'est.

Et alors en dérivant la relation donnée, on obtient : $\forall x \in \mathbf{R}, f''(x) = f'(-x)$. Or, $f'(-x) = -f(x)$ et donc $f''(x) + f(x) = 0$.

Et donc f est solution de l'équation différentielle $y'' + y = 0$. Son polynôme caractéristique possède i et $-i$ comme racines, de sorte que f est de la forme $x \mapsto \lambda \cos(x) + \mu \sin(x)$, avec $(\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2$.

Inversement, soit f une fonction de la forme

$x \mapsto \lambda \cos(x) + \mu \sin(x)$, avec $(\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2$.

Alors $f'(x) = -\lambda \sin(x) + \mu \cos(x)$ et donc pour tout $x \in \mathbf{R}$,

$$f'(x) = -f(-x) \Leftrightarrow -\lambda \sin(x) + \mu \cos(x) = -\lambda \underbrace{\cos(-x)}_{=\cos(x)} - \mu \underbrace{\sin(-x)}_{=\sin(x)} \quad (\star).$$

En particulier, en évaluant en $x = 0$, il vient $\mu = -\lambda$, et donc f est de la forme $x \mapsto \lambda(\cos(x) - \sin(x))$, $\lambda \in \mathbf{R}$.

Et inversement, il est clair qu'une fonction de cette forme vérifie (\star) et donc satisfait à la condition initiale.

En résumé, les fonctions vérifiant la condition sont exactement les $x \mapsto \lambda(\cos x - \sin x)$, $\lambda \in \mathbf{R}$.

2. Si f est une solution, alors en dérivant la relation de l'énoncé, il vient

$$\forall x \in \mathbf{R}, f''(x) = -f'(-x) + e^{-x} - xe^{-x}.$$

Mais par hypothèse, $f'(-x) = f(x) - xe^x$, donc f vérifie

$$\forall x \in \mathbf{R}, f''(x) = -f(x) + xe^x + (1-x)e^{-x}.$$

Donc f est solution de $y'' + y = xe^x + (1-x)e^{-x}$ (E).

Les solutions de l'équation homogène sont les $x \mapsto \lambda \cos x + \mu \sin x$, $(\lambda, \mu) \in \mathbf{R}^2$.

Pour trouver des solutions particulières, cherchons des solutions de

$$(E_1) \quad y'' + y = xe^x \text{ et } (E_2) \quad y'' + y = (1-x)e^{-x}.$$

Malheureusement, vous n'êtes pas supposés savoir trouver de telles solutions⁵

⁵ Mea culpa...

À l'image de ce qui a été fait dans l'exercice 9, cherchons des solutions sous la forme $y_1 : x \mapsto (ax + b)e^{-x}$ et $y_2 : (cx + d)e^x$.

Après calculs, on trouve

$$y_1 : x \mapsto \frac{x-1}{2}e^x \text{ et } y_2 : x \mapsto -\frac{x}{2}e^{-x}.$$

Donc f est de la forme $x \mapsto \frac{x-1}{2}e^x - \frac{x}{2}e^{-x} + \lambda \cos(x) + \mu \sin(x)$.

Réciproquement, supposons qu'il existe deux réels λ et μ tels que pour tout $x \in \mathbf{R}$,

$$f(x) = \frac{x-1}{2}e^x - \frac{x}{2}e^{-x} + \lambda \cos(x) + \mu \sin(x).$$

Alors $f'(x) = \frac{x}{2}e^x + \frac{x-1}{2}e^{-x} - \lambda \sin(x) + \mu \cos(x)$.

Et donc on a pour tout $x \in \mathbf{R}$, $f'(x) = f(-x) + xe^{-x}$ si et seulement si

$$\frac{x}{2}e^x + \frac{x-1}{2}e^{-x} - \lambda \sin(x) + \mu \cos(x) = \frac{-x-1}{2}e^{-x} + \frac{x}{2}e^x + \lambda \cos(x) - \mu \sin(x) + xe^{-x}.$$

Soit si et seulement si pour tout $x \in \mathbf{R}$

$$-\lambda \sin(x) + \mu \cos(x) = \lambda \cos x - \mu \sin(x).$$

Une évaluation en 0 nous donne $\lambda = \mu$, et inversement, si $\lambda = \mu$, alors l'équation est satisfaite.

Donc l'ensemble des solutions est l'ensemble⁶ des fonctions de la forme

⁶ Infini.

$$f : x \mapsto \frac{x-1}{2}e^x - \frac{x}{2}e^{-x} + \lambda (\cos(x) + \sin(x)), \lambda \in \mathbf{R}.$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 9.12

Soit f une fonction vérifiant la relation de l'énoncé.

Commençons par noter que $\int_0^x (x-t)f(t) dt = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt$.

Or, par le théorème fondamental de l'analyse, $x \mapsto \int_0^x f(t) dt$ et $x \mapsto \int_0^x tf(t) dt$ sont de classe \mathcal{C}^1 .

Et donc la fonction $g : x \mapsto x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt$ est de classe \mathcal{C}^1 , et sa dérivée est donnée par :

$$g'(x) = \int_0^x f(t) dt + xf(x) - xf(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

Le théorème fondamental de l'analyse s'applique de nouveau, de sorte que g' est dérivable et $\forall x \in \mathbf{R}$, $g''(x) = f(x)$.

Et donc $f = 1 - g$ est deux fois dérivable, et

$$f''(x) = -g''(x) = -f(x) \Leftrightarrow f''(x) + f(x) = 0.$$

Ainsi, f est solution de l'équation différentielle $f'' + f = 0$, de sorte qu'il existe deux réels λ et μ tels que pour tout $x \in \mathbf{R}$, $f(x) = \lambda \cos(x) + \mu \sin(x)$.

Inversement, soit f une fonction de la forme $f(x) = \lambda \cos(x) + \mu \sin(x)$.

Alors pour tout $x \in \mathbf{R}$,

$$\begin{aligned} \int_0^x (x-t)f(t) dt &= x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt \\ &= x [\lambda \sin(t) - \mu \cos(t)]_0^x - [t(\lambda \sin(t) - \mu \cos(t))]_0^x + \int_0^x (\lambda \sin(t) - \mu \cos(t)) dt \\ &= x(\lambda \sin(x) - \mu \cos(x) + \mu) - x(\lambda \sin(x) - \mu \cos(x)) + [-\lambda \cos(t) - \mu \sin(t)]_0^x \\ &= -\lambda \cos(x) - \mu \sin(x) + \lambda + \mu x \\ &= -f(x) + \lambda + \mu x. \end{aligned}$$

Synthèse

N'oublions pas la synthèse : nous avons pour l'instant uniquement procédé à l'analyse : une solution est de la forme indiquée, mais rien ne dit que toutes ces fonctions soient bien solutions.

Intégration par parties.

Et donc on a $f(x) + \int_0^x (x-t)f(t) dt = 1$ pour tout $x \in \mathbf{R}$ si et seulement si $\lambda = 1$ et $\mu = 0$.

Ainsi, la seule fonction vérifiant la relation de l'énoncé est la fonction cosinus.

SOLUTION DE L'EXERCICE 9.13

On cherche donc les fonctions y dérivables sur un intervalle I telles que pour tout $x \in I$, $y'(x) = e^{x+y(x)}$.

Pour y fonction dérivable sur I , posons, conformément à l'indication de l'énoncé, $z = e^{-y}$.

Alors z est dérivable sur I , avec $z'(x) = -y'(x)e^{-y(x)}$.

Et donc y est solution de $y' = e^{x+y}$ si et seulement si

$$\forall x \in I, z'(x) = -e^{x+y(x)}e^{-y(x)} = -e^x.$$

Soit si et seulement si il existe $\lambda \in \mathbf{R}$ tel que $z(x) = -e^x + \lambda$.

Mais alors, on ne peut avoir $e^{y(x)} = -e^x + \lambda$ que pour $\lambda > 0$ et $\lambda > e^x \Leftrightarrow x < -\ln(\lambda)$.

Et donc les solutions de l'équation de départ sont les $x \mapsto -\ln(\lambda - e^x)$, définies sur $]-\infty, \ln(\lambda)[$, pour $\lambda > 0$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 9.14

1. $u_n = 9 \times 3^n - 2$
2. $u_n = 2^n(1 - n)$
3. $u_n = -3 + \frac{4}{2^n}$
4. $u_n = 2 \cos \frac{(n-1)\pi}{3}$

SOLUTION DE L'EXERCICE 9.15

Le polynôme caractéristique est $r^2 - 2 \cos \theta r + 1$, de discriminant $\Delta = 4(1 - \cos^2 \theta) = -4 \sin^2 \theta < 0$.

Donc les racines⁷ en sont $\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$ et $\cos \theta - i \sin \theta = e^{-i\theta}$. Il existe donc deux réels A et B tels que $u_n = A \cos(n\theta) + B \sin(n\theta)$.

⁷ Complexes.

Pour $n = 0$, on obtient $A = 1$, et pour $n = 1$, on a $\cos(\theta) + B \sin(\theta) = 1$, d'où

$$B = \frac{1 - \cos(\theta)}{\sin(\theta)} = \frac{2 \sin^2(\theta/2)}{\sin(\theta)} = \frac{2 \sin^2(\theta/2)}{2 \cos(\theta/2) \sin(\theta/2)} = \tan(\theta/2)$$

On a donc

$$u_n = \cos(n\theta) + \tan(\theta/2) \sin(n\theta) = \frac{\cos(\theta/2) \cos(n\theta) + \sin(\theta/2) \sin(n\theta)}{\cos(\theta/2)} = \frac{\cos\left(\frac{(2n-1)\theta}{2}\right)}{\cos(\theta/2)}$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 9.16

Soit (u_n) une suite telle que pour tout $n \in \mathbf{N}$, $u_{n+1} = au_n + b$.

Alors $u_{n+2} = au_{n+1} + b = a(u_{n+1} + (u_{n+1} - au_n)) = (a+1)u_{n+1} - au_n$.

Et donc pour tout $n \in \mathbf{N}$, $u_{n+2} - (a+1)u_{n+1} + au_n = 0$. On reconnaît bien là une relation définissant une suite récurrente linéaire d'ordre 2.

Son polynôme caractéristique est alors $X^2 - (a+1)X + a$, de discriminant $\Delta = (a+1)^2 - 4a = a^2 - 2a + 1 = (a-1)^2$.

Et donc les deux racines du polynôme caractéristique sont $r_1 = \frac{a+1 - (a-1)}{2} = 1$ et

$$r_2 = \frac{a+1 + a-1}{2} = a.$$

En particulier, la suite (v_n) donnée par l'énoncé vérifie la relation :

$$\forall n \in \mathbf{N}, v_{n+2} - 3v_{n+1} + 2v_n = 0.$$

Son polynôme caractéristique possède 1 et 2 comme racines. Il existe donc deux réels λ et μ tels que pour tout $n \in \mathbf{N}$, $v_n = \lambda + \mu 2^n$.

En particulier, on a $\begin{cases} v_0 = 2 = \lambda + \mu \\ v_1 = 1 = \lambda + 2\mu \end{cases}$, de sorte que $\lambda = 3$ et $\mu = -1$.

Et donc pour tout $n \in \mathbf{N}$, $v_n = 3 - 2^n$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 9.17

Supposons que f soit une fonction satisfaisant aux conditions de l'énoncé.

Soit $x > 0$. Définissons une suite u_n en posant $u_0 = x$ et $u_{n+1} = f(u_n)$, de sorte que

$$u_n = f^n(x) = \underbrace{(f \circ f \circ \dots \circ f)}_{n \text{ fois}}(x).$$

L'équation fonctionnelle de l'énoncé, appliquée à $f^n(x)$ permet de montrer que

$$f(f(f^n(x))) = 6f^n(x) - f(f^n(x)) = 0 \Leftrightarrow u_{n+2} = 6u_n - u_{n+1}.$$

Le polynôme caractéristique de cette suite récurrente linéaire d'ordre 2 est

$$r^2 + r - 6 = (r-2)(r+3).$$

Donc il existe deux réels A et B tels que pour tout $n \in \mathbf{N}$, $u_n = A2^n + B(-3)^n$.

Puisque $u_0 = x$ et $u_1 = f(x)$, on a

$$B = \frac{2x - f(x)}{5} \text{ et } A = \frac{3x + f(x)}{5}$$

Remarque

Ces deux racines sont confondues si et seulement si $a = 1$, soit si et seulement si (u_n) est arithmétique.

Si $B > 0$, alors pour tout $n \in \mathbf{N}$,

$$u_{2n+1} = A2^{2n+1} - B3^{2n+1} = -3^{2n+1} \left(B - A \left(\frac{2}{3} \right)^{2n+1} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty.$$

Ceci contredit la positivité de f , puisque $f^{2n+1}(x) = f(f^{2n}(x))$ doit être positif strictement. De même, si $B < 0$, alors pour tout $n \in \mathbf{N}$,

$$u_{2n} = 3^{2n} \left(B - A \left(\frac{2}{3} \right)^{2n+1} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$$

ce qui n'est pas davantage possible.

On en déduit que $B = 0$, et donc $f(x) = 2x$.

Inversement⁸, si f est la fonction $x \mapsto 2x$, alors f est bien à valeurs positives sur \mathbf{R}_+^* et pour tout $x > 0$,

$$f(f(x)) = 4x = 6x - 2x.$$

Donc la seule solution est $f : x \mapsto 2x$.

⁸ N'oublions pas la synthèse !